

Dactyle pelotonné – Production Fondation, Enregistrée et Certifiée

Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées

Les normes de base pour toutes les cultures sont énoncées dans [Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées](#). De plus, les normes suivantes s'appliquent au dactyle pelotonné.

Exigences concernant le terrain*

| Culture inspectée | NE doit PAS être produite sur un terrain qui : |
|--------------------|---|
| Fondation | a porté au cours de l'une des cinq (5) années précédant l'ensemencement : <ul style="list-style-type: none">• une culture non pédigrée de dactyle pelotonné.• une variété différente de dactyle pelotonné. a porté au cours de l'une des trois (3) années précédant l'ensemencement : <ul style="list-style-type: none">• une culture pédigrée de la même variété. |
| Enregistrée | a porté au cours de l'une des trois (3) années précédant l'ensemencement : <ul style="list-style-type: none">• une culture de dactyle pelotonné. |
| Certifiée | a porté au cours de l'une des deux (2) années précédant l'ensemencement : <ul style="list-style-type: none">• une culture de dactyle pelotonné. |

*Sauf dans le cas où des mesures de lutte chimique acceptables pour l'ACPS ont été prises pour éliminer les plants provenant d'une culture précédente de dactyle pelotonné.

Inspection des cultures

Les cultures de dactyle pelotonné doivent être inspectées durant l'épiaison et avant la récolte.

Âge du peuplement

Le nombre maximum d'années durant lesquelles des semences pédigrées peuvent être produites à partir d'un peuplement de dactyle pelotonné établi avec des semences de Sélectionneur ou Fondation est indiqué ci-dessous. La classe que l'on peut produire à partir d'un peuplement varie selon la classe utilisée pour établir la culture, les classes de semences par lesquelles une variété donnée peut être multipliée et le nombre d'années pendant lequel le peuplement a été en production.

| Lorsque la culture est établie avec des : | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|--|-----------|
| semences de Sélectionneur d'une variété avec une classe Enregistrée | | semences de Sélectionneur d'une variété sans une classe Enregistrée | | semences Fondation d'une variété sans une classe Enregistrée* | semences Fondation d'une variété avec une classe Enregistrée | |
| Fondation | Certifiée | Fondation | Enregistrée | Certifiée | Enregistrée | Certifiée |
| 3 ans | + | 3 ans | + | 3 ans | + | 3 ans |
| | | | | 6 ans | | |

*Ou lorsque la culture est établie avec des semences Enregistrées d'une variété avec une classe Enregistrée.

Normes applicables aux cultures

Isolement

La distance d'isolement doit être pratiquement exempte de plants qui peuvent faire une pollinisation croisée avec la culture inspectée. Le risque que posent pour la pureté variétale les plants qui peuvent faire une pollinisation croisée varie selon la superficie, la densité, le stade de maturité et la distance par rapport à la culture inspectée. Ces facteurs seront pris en compte dans la détermination du statut pédigré de la culture inspectée. Il ne devrait pas y avoir plus de 3 plants au mètre carré, en moyenne, de plants qui peuvent faire une pollinisation croisée avec la culture inspectée dans la distance d'isolement requise adjacente à une culture inspectée.

Distances d'isolement minimales requises entre une culture inspectée et d'autres cultures :

| 1. Pureté variétale | Distance |
|---|--------------------------------|
| a. Dactyle pelotonné pédigré inspecté de même variété et classe | 1 mètre (3 pieds) |
| b. Dactyle pelotonné pédigré inspecté de même variété, classe différente | 3 mètres (10 pieds) |
| c. Ensemencée avec des semences Certifiées de la même variété | 3 mètres (10 pieds)* |
| d. Variétés différentes de dactyle pelotonné ou dactyle pelotonné non pédigré | Tableau d'isolement ci-dessous |

* Pour une culture destinée au statut Certifié seulement, pourvu que l'origine généalogique des semences Certifiées utilisées puisse être établie.

| Superficie de la culture inspectée | Distance d'isolement minimale | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | Fondation | Enregistrée | Certifiée |
| 5 acres ou moins | 400 m (1 312 pi) | 300 m (984 pi) | 150 m (492 pi) |
| Plus de 5 acres | 300 m (984 pi) | 100 m (328 pi) | 50 m (164 pi) |

Isolement par l'enlèvement d'une bordure :

Pour les cultures d'une superficie supérieure à cinq acres, l'enlèvement d'une bordure de la culture inspectée au lieu de l'isolement requis par rapport à une variété différente ou à un dactyle pelotonné non pédigré est permis comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. La bordure doit avoir libéré son pollen avant d'être enlevée.

| Culture inspectée | Enlèvement d'une bordure au lieu de distances d'isolement | |
|--------------------|---|---|
| | Distance réelle d'isolement de la source de contamination | Distance à enlever à partir de la culture de semences inspectée |
| Fondation | 300 m (984 pi) + | 0 m (0 pi) |
| | 200 à 299 m (656 à 983 pi) | 3 m (10 pi) |
| | 150 à 199 m (492 à 655 pi) | 5 m (16 pi) |
| | moins de 150 m (492 pi) | 5 m (16 pi) + 150 m (492 pi) moins la distance réelle d'isolement |
| Enregistrée | 100 m (328 pi) + | 0 m (0 pi) |
| | 75 à 99 m (246 à 327 pi) | 3 m (10 pi) |
| | 50 à 74 m (164 à 245 pi) | 5 m (16 pi) |
| | moins de 50 m (164 pi) | 5 m (16 pi) + 50 m (164 pi) moins la distance réelle d'isolement |
| Certifiée | 50 m (164 pi) | 0 m (0 pi) |
| | 30 à 49 m (98 à 163 pi) | 3 m (10 pi) |
| | 25 à 29 m (82 à 97 pi) | 5 m (16 pi) |
| | moins de 25 m (82 pi) | 5 m (16 pi) + 25 m (82 pi) moins la distance réelle d'isolement |

Tolérances maximales d'impuretés

1. Pureté variétale (en moyenne dans 10 ou 100 m²)

- a. Hors-types/autres variétés de la même espèce
 - i. Fondation – 3 plants/100 m²
 - ii. Enregistrée – 1 plant/10 m²
 - iii. Certifiée – 1 plant/10 m²

2. Pureté mécanique

- a. Les plants avec des semences difficiles à séparer (DAS) de celles de la culture inspectée seront déclarés en fonction de la fréquence dans le champ et ne seront pas pris en compte dans la décision de certification de la culture de semences. Dans le cas du dactyle pelotonné, cela inclut les agrostides, les pâturins et l'agrostide blanche.