

Caméline – Production de parcelles Select

Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées

Les normes de base pour toutes les cultures sont énoncées dans [Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées](#). Les normes de base pour toutes les parcelles sont énoncées dans [Exigences générales pour la production de parcelles](#). De plus, les normes suivantes s'appliquent à la caméline.

Classes et générations

Sélectionneur : aucune limite de générations.

Select : cinq générations.

Fondation : une génération.

Enregistrée : une génération.

Certifiée : une génération.

Dans le cas des producteurs qui ne sont pas agréés par l'ACPS pour produire des parcelles et qui utilisent des semences de Sélectionneur ou Select, l'ACPS se réserve le droit de déterminer le statut de la culture et peut délivrer un certificat de culture Enregistrée ou Certifiée.

Exigences concernant le terrain

Culture inspectée	NE doit PAS être produite sur un terrain qui :
Select	<p>a porté l'année précédente :</p> <ul style="list-style-type: none">une culture de caméline, de canola, de carinata, de moutarde, de radis ou de colza.

(1) Le statut accordé aux cultures de caméline est fonction de la culture précédente.

- a) Les exigences concernant le terrain visent à empêcher la production d'une culture (de la même variété) d'un statut pédigré supérieur au statut pédigré de la culture produite sur le terrain en question l'année précédente.

Inspection des cultures

Les cultures de caméline doivent être inspectées à la floraison, mais pas avant qu'au moins 50 % des plants aient au moins une fleur.

Normes applicables aux cultures

Isolement

Distances d'isolement minimales requises entre une culture inspectée et d'autres cultures :

1. Pureté variétale	Distance
a. Culture inspectée de caméline pédigrée de la même variété	3 mètres (10 pieds)

- | | |
|---|----------------------|
| b. Variétés différentes de caméline ou caméline non pédigrée | 10 mètres (33 pieds) |
| c. Culture inspectée de caméline pédigrée de la même variété contaminée par des hors-types ou d'autres variétés de caméline | 10 mètres (33 pieds) |

2. Pureté mécanique

Distance

- | | |
|--|---------------------|
| a. Alpiste des Canaries, canola, carinata, lin, moutarde, radis, colza | 3 mètres (10 pieds) |
|--|---------------------|

Mauvaises herbes

1. Les plants de laitue scariole (*Lactuca serriola*), de tabouret des champs (*Thlaspi arvensis*) et de bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris*) peuvent produire des semences qui sont difficiles à séparer de la caméline. Les cultures qui ont un nombre excessif de ces mauvaises herbes peuvent se voir refuser le statut pédigré.

Tolérances maximales d'impuretés

1. **Pureté variétale** (hors-types/autres variétés en moyenne dans 20 000 plants)
 - a. Select - 1