

# Alpiste roseau – Production Fondation, Enregistrée et Certifiée

## Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées

Les normes de base pour toutes les cultures sont énoncées dans [Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédigrées](#). De plus, les normes suivantes s’appliquent à l’alpiste roseau.

### Exigences concernant le terrain\*

Culture inspectée	NE doit PAS être produite sur un terrain qui :
<b>Fondation</b>	a porté au cours de l’une des cinq (5) années précédant l’ensemencement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une culture non pédigrée d’alpiste roseau.</li> <li>• une variété différente d’alpiste roseau.</li> </ul> a porté au cours de l’une des trois (3) années précédant l’ensemencement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une culture pédigrée de la même variété.</li> </ul>
<b>Enregistrée</b>	a porté au cours de l’une des trois (3) années précédant l’ensemencement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une culture d’alpiste roseau.</li> </ul>
<b>Certifiée</b>	a porté au cours de l’une des deux (2) années précédant l’ensemencement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une culture d’alpiste roseau.</li> </ul>

\*Sauf dans le cas où des mesures de lutte chimique acceptables pour l’ACPS ont été prises pour éliminer les plants provenant d’une culture précédente d’alpiste roseau.

## Inspection des cultures

Les cultures d’alpiste roseau doivent être inspectées durant l’épiaison et avant la récolte.

## Âge du peuplement

Le nombre maximum d’années durant lesquelles des semences pédigrées peuvent être produites à partir d’un peuplement d’alpiste roseau établi avec des semences de Sélectionneur ou Fondation est indiqué ci-dessous. La classe que l’on peut produire à partir d’un peuplement varie selon la classe utilisée pour établir la culture, les classes de semences par lesquelles une variété donnée peut être multipliée et le nombre d’années pendant lequel le peuplement a été en production.

Lorsque la culture est établie avec des :								
semences de Sélectionneur d’une variété sans une classe Enregistrée		semences de Sélectionneur d’une variété avec une classe Enregistrée		semences Fondation d’une variété sans une classe Enregistrée	semences Fondation d’une variété avec une classe Enregistrée			
Fondation	Certifiée	Fondation	Enregistrée	Certifiée	Enregistrée	Certifiée		
4 ans	+	4 ans	+	4 ans	8 ans	4 ans	+	4 ans

## Normes applicables aux cultures

### Isolement

La distance d'isolement doit être pratiquement exempte de plants qui peuvent faire une pollinisation croisée avec la culture inspectée. Le risque que posent pour la pureté variétale les plants qui peuvent faire une pollinisation croisée varie selon la superficie, la densité, le stade de maturité et la distance par rapport à la culture inspectée. Ces facteurs seront pris en compte dans la détermination du statut pédigré de la culture inspectée. Il ne devrait pas y avoir plus de 3 plants au mètre carré, en moyenne, de plants qui peuvent faire une pollinisation croisée avec la culture inspectée dans la distance d'isolement requise adjacente à une culture inspectée.

### Distances d'isolement minimales requises entre une culture inspectée et d'autres cultures :

1. Pureté variétale	Distance
a. Alpiste roseau pédigré inspecté de même variété et classe	1 mètre (3 pieds)
b. Alpiste roseau pédigrée inspectée de même variété, classe différente	3 mètres (10 pieds)
c. Ensemencée avec des semences Certifiées de la même variété	3 mètres (10 pieds)*
d. Variétés différentes d'alpiste roseau ou alpiste roseau non pédigré	Tableau ci-dessous

\* Pour une culture destinée au statut Certifié seulement, pourvu que l'origine généalogique des semences Certifiées utilisées puisse être établie.

Superficie de la culture inspectée	Distance d'isolement minimale		
	Fondation	Enregistrée	Certifiée
5 acres ou moins	400 m (1 312 pi)	300 m (984 pi)	150 m (492 pi)
Plus de 5 acres	300 m (984 pi)	100 m (328 pi)	50 m (164 pi)

### Isolement par l'enlèvement d'une bordure :

Pour les cultures d'une superficie supérieure à cinq acres, l'enlèvement d'une bordure de la culture inspectée au lieu de l'isolement requis par rapport à une variété différente ou à de l'alpiste roseau non pédigré est permis comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. La bordure doit avoir libéré son pollen avant d'être enlevée.

Culture inspectée	Enlèvement d'une bordure au lieu de distances d'isolement	
	Distance réelle d'isolement de la source de contamination	Distance à enlever à partir de la culture de semences inspectée
<b>Fondation</b>	300 m (984 pi) +	0 m (0 pi)
	200 à 299 m (656 à 983 pi)	3 m (10 pi)
	150 à 199 m (492 à 655 pi)	5 m (16 pi)
	moins de 150 m (492 pi)	5 m (16 pi) + 150 m (492 pi) moins la distance réelle d'isolement
<b>Enregistrée</b>	100 m (328 pi) +	0 m (0 pi)
	75 à 99 m (246 à 327 pi)	3 m (10 pi)
	50 à 74 m (164 à 245 pi)	5 m (16 pi)
	moins de 50 m (164 pi)	5 m (16 pi) + 50 m (164 pi) moins la distance réelle d'isolement

<b>Enlèvement d'une bordure au lieu de distances d'isolement</b>		
<b>Culture inspectée</b>	<b>Distance réelle d'isolement de la source de contamination</b>	<b>Distance à enlever à partir de la culture de semences inspectée</b>
<b>Certifiée</b>	50 m (164 pi)	0 m (0 pi)
	30 à 49 m (98 à 163 pi)	3 m (10 pi)
	25 à 29 m (82 à 97 pi)	5 m (16 pi)
	moins de 25 m (82 pi)	5 m (16 pi) + 25 m (82 pi) moins la distance réelle d'isolement

### **Tolérances maximales d'impuretés**

1. **Pureté variétale** (hors-types/autres variétés en moyenne dans 10 ou dans 100 m<sup>2</sup>)
  - a. Fondation – 3 plants/100 m<sup>2</sup>
  - b. Enregistrée – 1 plant/10 m<sup>2</sup>
  - c. Certifiée – 1 plant/10 m<sup>2</sup>