

# Radis – Production Certifiée de *R. sativus*

Les exigences présentées ici sont précisément pour la production Certifiée de *R. sativus* à pollinisation libre.

## Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédiées

Les normes de base pour toutes les cultures sont énoncées dans [Exigences générales pour toutes les cultures de semences pédiées](#). De plus, les normes suivantes s'appliquent à *R. sativus* à pollinisation libre.

### Exigences concernant le terrain

Culture inspectée	NE doit PAS être produite sur un terrain sur lequel :
Certifiée	au cours de l'une des trois (3) années précédentes on a ensemencé ou produit une culture de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• canola/colza (<i>B. napus</i>, <i>B. rapa</i>)</li> <li>• carinata (<i>B. carinata</i>)</li> <li>• moutarde (<i>B. juncea</i>, <i>S. alba</i>)</li> <li>• radis (<i>R. sativus</i>)</li> </ul>
Culture inspectée	PEUT être produite sur un terrain qui :
Certifiée	a porté au cours de l'une des trois (3) années précédentes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une parcelle de la même variété qui a obtenu le statut Fondation</li> </ul>

### Inspection des cultures

Les cultures de *R. sativus* à pollinisation libre doivent être inspectées lorsque la culture est au début de la floraison.

### Normes applicables aux cultures

#### Isolement

Les 50 premiers mètres de la distance d'isolement doivent être pratiquement exempts de plants qui peuvent se croiser librement (PC dans le tableau ci-dessous) avec la culture de semences inspectée (pas plus de 1 plant par 100 mètres carrés en moyenne) et le reste de la distance doit être raisonnablement exempt de plants qui peuvent se croiser librement avec la culture inspectée (pas plus de 1 plant par 10 mètres carrés en moyenne).

Le risque que posent pour la pureté variétale les plants qui peuvent se croiser librement varie selon la superficie, la densité, le stade de maturité et la distance par rapport à la culture inspectée. Ces facteurs seront pris en compte dans la détermination du statut pédié de la culture inspectée.

#### Distances d'isolement minimales requises entre une culture inspectée et d'autres cultures :

1. Pureté variétale	Distance
a. Culture ensemencée avec des semences Certifiées* de la même variété	3 mètres (10 pieds)
b. Différente variété de <i>R. sativus</i> ou culture non pédiée de <i>R. sativus</i>	200 mètres (656 pieds)

\* Pourvu que l'origine généalogique des semences Certifiées utilisées puisse être établie.

**2. Pureté mécanique****Distance**

- a. *B. napus*, *B. rapa*, *B. juncea*, *B. carinata*, ou *S. alba*

3 mètres (10 pieds)

**Mauvaises herbes**

1. La présence de gaillet gratteron (*Galium aparine*) justifie le refus du statut pédigré.
2. Il ne doit pas y avoir plus de 1 plant de moutarde des champs (*Sinapis arvensis*) en moyenne par 10 000 plants dans la zone de la culture à récolter pour la semence.

**Tolérances maximales d'impuretés**

1. **Pureté variétale** (en moyenne dans 10 000 plants)
  - a. Hors-types/autres variétés de la même espèce – 1,5
  - b. Plants d'espèces qui peuvent se croiser librement (PC dans le tableau ci-dessous) – 1
2. **Pureté mécanique** (en moyenne dans 10 000 plants)
  - a. Plants d'espèces dont les semences sont difficiles à séparer (DAS dans le tableau ci-dessous) – 3

Espèce	Canola ( <i>B. napus</i> )	Canola ( <i>B. rapa</i> )	Moutarde brune/orientale ( <i>B. juncea</i> )	Moutarde blanche/jaune ( <i>S. alba</i> )	Carinata ( <i>B. carinata</i> )	Radis ( <i>R. sativus</i> )
<i>R. sativus</i>	DAS	DAS	DAS	DAS	DAS	s.o.